

### ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA

#### Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

##### Stadio fenologico:

Il germogliamento procede in modo regolare ed uniforme; in alcune zone siamo allo stadio di sviluppo delle foglie (BBCH-012) mentre in altre, collinari (probabilmente più calde) arriviamo anche a grappoli separati (BBCH-55).

Varietà	Minimo	Massimo
Corvina	BBCH-12 (sviluppo foglie)	BBCH-55 (grappoli separati)
Garganega	BBCH-12 (sviluppo foglie)	BBCH-14 (4 foglie spiegate)
Chardonnay	BBCH-13 (3 foglie spiegate)	BBCH-55 (grappoli separati)
Pinot Grigio	BBCH-12 (sviluppo foglie)	BBCH-55 (grappoli separati)

##### Andamento meteo:

Nei giorni scorsi c'è stato bel tempo, da oggi inizia un periodo di perturbazione che, secondo le previsioni, continuerà fino alla giornata di venerdì con temperature variabili dai 14 ai 20°C.

La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 11/05/2021, considerato l'andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori:

##### Difesa fitosanitaria:

**Peronospora e Oidio:** considerate le notevoli piogge previste e temperature medie a cavallo dei 16-18° C, il pericolo di infezione per la peronospora è molto elevato. Si consiglia di **ripristinare le coperture** intervenendo nelle finestre di bel tempo utilizzando prodotti adeguati alla strategia aziendale.

Si consiglia, per le varietà in cui la cui vegetazione è ben sviluppata, di abbinare un prodotto **endoterapico** (citotropico o sistemico) e/o **induttore di resistenza** con adeguato antiodico.

Per il **biologico** continuare le coperture con dosaggi di rame adeguati al pericolo e con zolfo a dosi di etichetta abbinando prodotti **induttori di resistenza**.

Può essere utile abbinare in tutti i trattamenti (sia convenzionali che bio) prodotti adesivanti/bagnanti. Si ricorda di adeguare il volume di irrorazione allo sviluppo vegetativo della vite.

**Tignoletta** (*Lobesia botrana*): il volo di prima generazione è in deciso calo. Mantenere monitorate le trappole posizionate

**Cocciniglie:** è iniziata la migrazione delle neanidi. Nel caso se ne noti presenza, contattare il proprio tecnico.

**Ingiallimenti o germogliamenti irregolari:** si consiglia di intervenire con biostimolanti (alghe o amminoacidi).

##### Operazioni colturali:

Ad avvenuta fioritura delle specie erbacee si raccomanda lo **sfalcio a filari alterni**.

Provvedere precocemente alla scacchiatura e alla spollonatura prima che i germogli siano troppo sviluppati; in tal modo si evitano ferite dannose.

Per chi intende effettuare la spollonatura chimica, intervenire al più presto, appena le condizioni meteo lo permetteranno. **ATTENZIONE:** utilizzare attrezzature schermate, prodotti bagnanti ed **EVITARE GIORNATE VENTOSE**.

Nella zona grandinata, si consiglia di contattare i propri tecnici per valutare la più corretta gestione di caso per caso.

Questo comunicato è redatto seguendo il **Disciplinare di produzione integrata** della Regione Veneto. Prossimo comunicato martedì 18 maggio.