

ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

Stadio fenologico:

L'accrescimento procede in modo regolare; si va dallo stadio di fine fioritura (BBCH-069) a quello di chiusura grappolo (BBCH-77).

Varietà	Minimo	Massimo
Corvina	BBCH-71 (allegagione)	BBCH-75 (sviluppo acini)
Garganega	BBCH-69 (fine fioritura)	BBCH-71 (allegagione)
Chardonnay	BBCH-71 (allegagione)	BBCH-77 (chiusura grappolo)
Pinot Grigio	BBCH-71 (allegagione)	BBCH-77 (chiusura grappolo)

Andamento meteo:

Nei giorni scorsi come previsto, c'è stato bel tempo con temperature elevate. Si prevede bel tempo almeno fino a fine settimana con temperature elevate.

La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 22/06/2021, considerato l'andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori:

Difesa fitosanitaria:

Peronospora: Si sono riscontrate diverse infezioni di peronospora secondaria, si consiglia di **mantenere le coperture** intervenendo agli intervalli previsti in etichetta preferendo prodotti che si legano alle cere.

Oidio: si consiglia di abbinare allo zolfo un prodotto antioidico specifico, adeguato alla strategia adottata per la peronospora in considerazione delle elevate temperature e del rischio elevato.

Per il **biologico** continuare le coperture con dosaggi di rame adeguati al pericolo e con zolfo a dosi di etichetta abbinando prodotti **induttori di resistenza**.

Tignoletta (*Lobesia botrana*): è iniziato il volo di seconda generazione in quasi tutti gli areali. Da fine settimana è possibile posizionare un prodotto ovicida (fuori dalla confusione sessuale)

Mantenere monitorate le trappole posizionate per il controllo della seconda generazione.

Botrite: prima della chiusura grappolo è possibile intervenire con antibotritico specifico sulle varietà particolarmente sensibili

Cocciniglie: prosegue la migrazione delle neanidi. Nel caso se ne noti presenza, contattare il proprio tecnico.

Ingiallimenti: si consiglia di intervenire con **biostimolanti** (alghie o amminoacidi) e **prodotti a base di ferro**.

Virosi: l'andamento stagionale sta favorendo la comparsa di sintomi riconducibili a virusi.

Può essere utile abbinare in tutti i trattamenti (sia convenzionali che bio) prodotti **adesivanti/bagnanti**.

Si ricorda di adeguare il **volume di irrorazione** allo sviluppo vegetativo della vite.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle etichette dei prodotti usati, di rispettare gli intervalli tra gli interventi e di cambiare il nome commerciale del prodotto o il principio attivo nel caso di trattamenti ravvicinati.

Operazioni colturali:

Proseguire le cimature.

A breve eseguire una defogliatura nella zona grappolo prestando attenzione alle scottature. Si consiglia per le varietà sensibili di defogliare solo dalla parte nord o est del filare per ridurre il fenomeno.

Ad avvenuta fioritura delle specie erbacee si raccomanda lo **sfalcio a filari alterni**.

La dove ce ne fosse bisogno, a seconda dei propri terreni, iniziare o proseguire l'irrigazione.

Prossimo comunicato martedì 29 giugno.

Questo comunicato è redatto seguendo il **Disciplinare di produzione integrata** della Regione Veneto.