

ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

Stadio fenologico:

L'accrescimento procede in modo regolare; si va dallo stadio di allegagione BBCH-71 a quello di chiusura grappolo (BBCH-77).

Varietà	Minimo	Massimo
Corvina	BBCH-75 (sviluppo acini)	BBCH-77 (chiusura grappolo)
Garganega	BBCH-71 (allegagione)	BBCH-75 (sviluppo acini)
Chardonnay	BBCH-75 (sviluppo acini)	BBCH-77 (chiusura grappolo)
Pinot Grigio	BBCH-75 (sviluppo acini)	BBCH-77 (chiusura grappolo)

Andamento meteo:

Nei giorni scorsi come previsto, c'è stato bel tempo con temperature elevate. Si prevede bel tempo almeno fino a fine settimana con temperature elevate.

La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 29/06/2021, considerato l'andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori:

Difesa fitosanitaria:

Peronospora: Le infezioni riscontrate le scorse settimane sono ancora attive; si consiglia di **mantenere le coperture** intervenendo agli intervalli previsti in etichetta. Si ricorda che dopo l'allegagione non si possono più usare i **ditiocarbammati**.

Oidio: si consiglia di abbinare allo zolfo un prodotto antioidico specifico, adeguato alla strategia adottata per la peronospora in considerazione delle elevate temperature e del rischio elevato.

Per il **biologico** continuare le coperture con dosaggi di rame adeguati al pericolo e con zolfo a dosi di etichetta abbinando prodotti **induttori di resistenza**.

Tignoletta (*Lobesia botrana*): continua il volo di seconda generazione in tutti gli areali. Entro questo fine settimana è possibile trattare con un prodotto ovo-larvicida (fuori dalla confusione sessuale) mentre, dalla settimana prossima, si può scegliere un prodotto larvicida.

Mantenere monitorate le trappole posizionate per il controllo della seconda generazione.

Flavescenza dorata: sono state riscontrate presenze di *Scaphoideus Titanus*. Il **decreto di lotta obbligatoria** prevede un trattamento dove vengono riscontrate contemporaneamente sia la presenza dello *Scaphoideus* che i sintomi della flavescenza e l'estirpo delle piante sintomatiche. Prestare particolare attenzione alle varietà sensibili quali: **chardonnay, pinot grigio, sangiovese**.

Botrite: prima della chiusura grappolo è possibile intervenire con antibotritico specifico sulle varietà particolarmente sensibili

Ingiallimenti: si consiglia di intervenire con **biostimolanti** (alghe o amminoacidi) e **prodotti a base di ferro**.

Viste le alte temperature si ricorda di trattare nelle ore più fresche della giornata. Può essere utile abbinare in tutti i trattamenti (sia convenzionali che bio) prodotti **adesivanti/bagnanti**.

Si ricorda di adeguare il **volume di irrorazione** allo sviluppo vegetativo della vite.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle etichette dei prodotti usati, di rispettare gli intervalli tra gli interventi e di **cambiare il nome commerciale del prodotto o il principio attivo nel caso di trattamenti ravvicinati**.

Operazioni colturali:

Proseguire le cimature.

Si consiglia di fermarsi con le sfogliature per evitare danni da scottature.

Ad avvenuta fioritura delle specie erbacee si raccomanda lo **sfalcio a filari alterni**.

Proseguire l'irrigazione.

Prossimo comunicato martedì 6 luglio.