

ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

Stadio fenologico:

L'accrescimento procede in modo regolare; si va dallo stadio di grappoli separati (BBCH-055) a quello di 20/30% di fiori aperti (BBCH-63).

Varietà	Minimo	Massimo
Corvina	BBCH-55 (grappoli separati)	BBCH-61 (inizio fioritura)
Garganega	BBCH-55 (grappoli separati)	BBCH-53 (grappoli visibili)
Chardonnay	BBCH-55 (grappoli separati)	BBCH-63 (20/30% dei fiori aperti)
Pinot Grigio	BBCH-55 (grappoli separati)	BBCH-63 (20/30% dei fiori aperti)

Andamento meteo:

Nei giorni scorsi, come previsto, c'è stato un miglioramento delle condizioni meteorologiche con innalzamento delle temperature. Si prevede bel tempo fino a fine settimana con temperature in ulteriore aumento.

La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 01/06/2021, considerato l'andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori:

Difesa fitosanitaria:

Peronospora: Sono già state riscontrate diverse infezioni di peronospora, anche su grappolo; quindi si consiglia di **ripristinare le coperture** intervenendo prima delle prossime piogge, appena possibile, utilizzando prodotti adeguati alla strategia aziendale.

Si consiglia di abbinare un prodotto **endoterapico** (citotropico o sistemico) e/o **induttore di resistenza**.

Oidio: si consiglia di abbinare allo zolfo un prodotto antioidico specifico, adeguato alla strategia adottata per la peronospora.

Per il **biologico** continuare le coperture con dosaggi di rame adeguati al pericolo e con zolfo a dosi di etichetta abbinando prodotti **induttori di resistenza**.

Può essere utile abbinare in tutti i trattamenti (sia convenzionali che bio) prodotti **adesivanti/bagnanti**.

Si ricorda di adeguare il **volume di irrorazione** allo sviluppo vegetativo della vite.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle etichette dei prodotti usati, di rispettare gli intervalli tra gli interventi e di cambiare il nome commerciale del prodotto o il principio attivo nel caso di trattamenti ravvicinati.

Tignoletta (*Lobesia botrana*): il volo di prima generazione è terminato. Si sono trovate le prime larve.

Mantenere monitorate le trappole posizionate in vista della seconda generazione.

Cocciniglie: prosegua la migrazione delle neanidi. Nel caso se ne noti presenza, contattare il proprio tecnico.

Ingiallimenti: si consiglia di intervenire con **biostimolanti** (alghie o amminoacidi) e **prodotti a base di ferro**.

Virosi: l'andamento stagionale sta favorendo la comparsa di sintomi riconducibili a virosi.

Operazioni colturali:

Ad avvenuta fioritura delle specie erbacee si raccomanda lo **sfalcio a filari alterni**.

Nei vigneti più sviluppati, continuare la **palizzata** dei tralci.

Prossimo comunicato martedì 8 giugno.