

### ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA

#### Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

#### Stadio fenologico:

Nelle aree più esposte per la vite è iniziato il germogliamento; in altre zone siamo al pianto (fase fenologica da BBCH-01 a BBCH-9 germogliamento).

Varietà	Minimo	Massimo
Corvina	BBCH-01 (riposo)	BBCH-03 (3 foglie spiegate)
Garganega	BBCH-01 (riposo)	BBCH-01 (riposo)
Chardonnay	BBCH-01 (riposo)	BBCH-09 (germogliamento)
Pinot Grigio	BBCH-01 (riposo)	BBCH-09 (germogliamento)

#### Difesa fitosanitaria:

Con la ripresa vegetativa inizia l'attenzione verso i principali parassiti.

**Escoriosi:** In caso di bagnature prolungate è da valutare, per le sole varietà sensibili la cui vegetazione abbia raggiunto la fase di gemma cotonosa, un intervento preventivo con prodotti previsti dal disciplinare regionale da ripetere dopo circa 10 giorni. Per il biologico si può utilizzare zolfo ad alti dosaggi.

**Mal dell'esca:** sulle varietà sensibili (Corvina, Corvinone e Sauvignon) nella fase di pianto si può eseguire un trattamento con prodotti suggeriti dal disciplinare regionale.

**Tignoletta** (Lobesia botrana): Chi utilizza il metodo della confusione sessuale, applichi i dispenser entro il 9 aprile.

Al momento non si ravvede necessità di sfalcio dell'interfila. Ad avvenuta fioritura delle specie erbacee, si raccomanda lo sfalcio a filari alterni.

In vista dell'inizio della campagna fitosanitaria si ricorda di effettuare il controllo funzionale dell'atomizzatore e della barra del diserbo.

Ricordiamo che la normativa regionale non permette l'accensione di fuochi, anche a scopo antibrina, fino al 30 aprile.

Prossimo comunicato martedì 18 aprile.