

### ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA

#### Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

**Stadio fenologico:** Il germogliamento procede spedito e la vegetazione continua ad essere uniforme. La classe fenologica più frequente nel territorio è BBCH-61 (inizio fioritura).

Varietà	Minimo	Massimo
Corvina	CH-57 (infioresc. svliluppate)	BBCH-65 (piena fioritura )
Garganega	BBCH-53 (infiorescenze visibili)	CH-57 (infioresc. svliluppate)
Chardonnay	CH-57 (infioresc. svliluppate)	BBCH-65 (piena fioritura )
Pinot Grigio	CH-57 (infioresc. svliluppate)	BBCH-65 (piena fioritura )

**Andamento meteo:** I giorni scorsi sono stati caratterizzati da bel tempo ed alte temperature. Per i prossimi giorni si prevede qualche temporale ma di scarsa entità con temperature alte e sopra la media.

**La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 24/05/2022, considerato l'andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori:**

#### Difesa fitosanitaria:

**Peronospora:** Si consiglia di proseguire la difesa ripristinando la copertura a seconda delle strategie aziendali adottate.

Per le aziende **biologiche** si consiglia di utilizzare prodotti a base di rame con bagnanti specifici a cui si possono abbinare induttori di resistenza.

**Oidio:** il rischio di infezione rimane alto. Si consiglia di utilizzare zolfo a dosi elevate e/o antioidici specifici abbinandoli al trattamento per la peronospora. Alcuni induttori di resistenza hanno un'attività anche nei confronti dell'oidio.

**Black rot:** porre attenzione a questo patogeno di nuova introduzione; nella scelta dei prodotti contro l'oidio favorire prodotti ambivalenti che abbiano attività anche nei confronti del black rot.

**Cocciniglia (*parthenolecanium corni*):** si riscontrano alcuni focolai di cocciniglia; al momento non si notano migrazioni di neanidi. Sarà dato aggiornamento nei prossimi comunicati.

**NB: SI RICORDA DI NON EFFETTUARE TRATTAMENTI INSETTICICI IN FIORITURA.**

**Ingiallimenti:** in caso di ingiallimenti, si consiglia di intervenire al più presto con nutrizioni fogliari.

#### Operazioni colturali:

**Irrigazione:** vista la prolungata carenza idrica si consiglia di irrigare con almeno 20 litri di acqua per pianta.

**Palizzata:** Vista la veloce crescita vegetativa si consiglia di accelerare le operazioni di palizzata.

**Sfalcio a filari alterni:** si ricorda di effettuare lo sfalcio a filari alterni.

Prossimo comunicato martedì 31 maggio.

Questo comunicato è redatto seguendo il **Disciplinare di produzione integrata** della Regione Veneto.