

ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA

Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

Stadio fenologico: Il germogliamento procede spedito e la vegetazione continua ad essere uniforme. La classe fenologica più frequente nel territorio è BBCH-65 (piena fioritura).

Varietà	Minimo	Massimo
Corvina	BBCH-65 (piena fioritura)	BBCH-69 (fine fioritura)
Garganega	BBCH-57 (bottoni fiorali separati)	BBCH-61 (inizio fioritura)
Chardonnay	BBCH-65 (piena fioritura)	BBCH-69 (fine fioritura)
Pinot Grigio	BBCH-65 (piena fioritura)	BBCH-69 (fine fioritura)

Andamento meteo: I giorni scorsi sono stati caratterizzati da tempo perturbato con precipitazioni di scarsa entità. Per i prossimi giorni si prevede bel tempo con temperature in aumento.

La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 31/05/2022, considerato l'andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori:

Difesa fitosanitaria:

Peronospora: Si consiglia di proseguire la difesa ripristinando la copertura a seconda delle strategie aziendali adottate.

Per le aziende **biologiche** si consiglia di utilizzare prodotti a base di rame con bagnanti specifici a cui si possono abbinare induttori di resistenza.

SQNPI: Si ricorda che sulle varietà precoci non si possono più utilizzare ditiocarbammati (metiram).

Oidio: il rischio di infezione rimane alto. Si consiglia di utilizzare zolfo a dosi elevate e/o antioidici specifici abbinandoli al trattamento per la peronospora. Alcuni induttori di resistenza hanno un'attività anche nei confronti dell'oidio.

E' possibile utilizzare anche l'olio di arancio dolce.

Botrite: sulle varietà precoci a grappolo compatto tra fine fioritura e prechiusura grappolo effettuare trattamento antibotritico **dopo aver defogliato**.

Black rot: porre attenzione a questo patogeno di nuova introduzione; nella scelta dei prodotti contro l'oidio favorire prodotti ambivalenti che abbiano attività anche nei confronti del black rot.

Cocciniglia (*parthenolecanium corni*): si riscontrano alcuni focolai di cocciniglia; è iniziata la migrazione delle neanidi, nel caso contattare il proprio tecnico per valutare un eventuale trattamento. Sarà dato aggiornamento nei prossimi comunicati.

Planococcus ficus: sono state rilevate le neanidi; nel caso contattare il proprio tecnico.

NB: SI RICORDA DI NON EFFETTUARE TRATTAMENTI INSETTICICI IN FIORITURA.

GIALLUMI: In presenza di giallumi ascrivibili a Flavescenza dorata e/o legno nero contattare il proprio tecnico.

Ingiallimenti: in caso di ingiallimenti, si consiglia di intervenire al più presto con nutrizioni fogliari specifiche.

Operazioni colturali:

Irrigazione: vista la prolungata carenza idrica si consiglia di irrigare con almeno 20 litri di acqua per pianta.

Palizzata: Vista la veloce crescita vegetativa si consiglia di accelerare le operazioni di palizzata e cimatura (topping).

Defogliatura: sulle varietà precoci procedere con la sfogliatura.

Sfalcio a filari alterni: si ricorda di effettuare lo sfalcio a filari alterni.

Prossimo comunicato martedì 8 giugno.