

### ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA

#### Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

**Stadio fenologico:** L'accrescimento degli acini procede spedito. La classe fenologica più frequente nel territorio è BBCH-73 (sviluppo acini).

Varietà	Minimo	Massimo
Corvina	BBCH-73 (sviluppo acini)	BBCH-77 (chiusura grappolo)
Garganega	BBCH-71 (allegagione)	BBCH-73 (sviluppo acini)
Chardonnay	BBCH-73 (sviluppo acini)	BBCH-77 (chiusura grappolo)
Pinot Grigio	BBCH-73 (sviluppo acini)	BBCH-77 (chiusura grappolo)

**Andamento meteo:** I giorni scorsi sono stati caratterizzati da tempo sereno. Per i prossimi giorni si prevede bel tempo e temperature in aumento.

**La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 14/06/2022, considerato l'andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori:**

#### Difesa fitosanitaria:

**Peronospora:** Si consiglia di proseguire la difesa ripristinando la copertura a seconda delle strategie aziendali adottate.

Per le aziende **biologiche** si consiglia di utilizzare prodotti a base di rame con bagnanti specifici a cui si possono abbinare induttori di resistenza.

**SQNPI:** Si ricorda che non si possono più utilizzare i ditiocarbammati (metiram).

**Oidio:** il rischio di infezione rimane alto. Si consiglia di utilizzare zolfo a dosi elevate e/o antioidici specifici abbinandoli al trattamento per la peronospora. Alcuni induttori di resistenza hanno un'attività anche nei confronti dell'oidio.

È possibile utilizzare anche l'olio di arancio dolce.

**Black rot:** porre attenzione a questo patogeno di nuova introduzione; nella scelta dei prodotti contro l'oidio favorire prodotti ambivalenti che abbiano attività anche nei confronti del black rot.

**Cocciniglia (*parthenolecanium corni*) e minatori fogliari:** mantenere monitorati i vigneti e nel caso contattare il proprio tecnico.

**Tiguoletta:** è iniziato il volo di seconda generazione.

**FUORI DALLA ZONA A CONFUSIONE SESSUALE** chi intende effettuare un trattamento ovicida specifico lo posizioni tra il 17 al 21 giugno pv.

**Scaphoideus titanus:** continua il monitoraggio; si rilevano ancora solo stadi giovanili; saranno dati aggiornamenti nel prossimo bollettino.

**GIALLUMI: In presenza di giallumi ascrivibili a Flavescenza dorata e/o legno nero contattare il proprio tecnico ed ESTIRPARE LE PIANTE SINTOMATICHE.**

**Ingiallimenti:** in caso di ingiallimenti, si consiglia di intervenire al più presto con nutrizioni fogliari specifiche.

#### Operazioni colturali:

**Irrigazione:** vista la prolungata carenza idrica si consiglia di irrigare con almeno 20 litri di acqua per pianta.

Prossimo comunicato martedì 21 giugno.