

ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA

Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

Stadio fenologico: Il germogliamento procede spedito e la vegetazione risulta in anticipo rispetto alla scorsa stagione. La classe fenologica più frequente nel territorio è BBCH-67 (fine fioritura).

Varietà	Minimo	Massimo
Corvina	BBCH-69 (fine fioritura)	BBCH-71 (inizio allegagione)
Garganega	BBCH-65 (piena fioritura)	BBCH-69 (fine fioritura)
Chardonnay	BBCH-71 (inizio allegagione)	BBCH-73 (sviluppo acini)
Pinot Grigio	BBCH-71 (inizio allegagione)	BBCH-73 (sviluppo acini)

Andamento meteo: I giorni scorsi sono stati caratterizzati da tempo sereno con episodi temporaleschi di scarsa entità in qualche areale. Per i prossimi giorni si prevede tempo variabile.

La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 06/06/2022, considerato l'andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori:

Difesa fitosanitaria:

Peronospora: Si consiglia di proseguire la difesa ripristinando la copertura a seconda delle strategie aziendali adottate.

Per le aziende **biologiche** si consiglia di utilizzare prodotti a base di rame con bagnanti specifici a cui si possono abbinare induttori di resistenza.

SQNPI: Si ricorda che non si possono più utilizzare i ditiocarbammati (metiram).

Oidio: il rischio di infezione rimane alto. Si consiglia di utilizzare zolfo a dosi elevate e/o antioidici specifici abbinandoli al trattamento per la peronospora. Alcuni induttori di resistenza hanno un'attività anche nei confronti dell'oidio.

È possibile utilizzare anche l'olio di arancio dolce.

Botrite: sulle varietà precoci a grappolo compatto tra fine fioritura e prechiusura grappolo effettuare trattamento antibotritico **dopo aver defogliato**.

Black rot: porre attenzione a questo patogeno di nuova introduzione; nella scelta dei prodotti contro l'oidio favorire prodotti ambivalenti che abbiano attività anche nei confronti del black rot.

Cocciniglia (*parthenolecanium corni*): si riscontrano alcuni focolai di cocciniglia; è iniziata la migrazione delle neanidi, nel caso contattare il proprio tecnico per valutare un eventuale trattamento da effettuare i primi giorni della prossima settimana.

Planococcus ficus: sono state rilevate le neanidi; nel caso contattare il proprio tecnico.

GIALLUMI: In presenza di giallumi ascrivibili a Flavescenza dorata e/o legno nero contattare il proprio tecnico.

In previsione di un eventuale trattamento contro lo Scaphoideus titanus, di cui sarà data indicazione in un bollettino specifico, provvedere allo sfalcio totale dell'interfila, alla spollonatura e alla sistemazione della chioma.

Ingiallimenti: in caso di ingiallimenti, si consiglia di intervenire al più presto con nutrizioni fogliari specifiche.

Operazioni colturali:

Irrigazione: vista la prolungata carenza idrica si consiglia di irrigare con almeno 20 litri di acqua per pianta.

Palizzata: Vista la veloce crescita vegetativa si consiglia di accelerare le operazioni di palizzata e cimatura (topping).

Defogliatura: sulle varietà precoci velocizzare la defogliatura.