

ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA

Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

Stadio fenologico: Il germogliamento procede con un'accelerazione negli ultimi giorni. Per alcune varietà tardive, come la garganega, siamo allo stadio di germogliamento BBCH09; per le varietà precoci siamo a 4 foglie distese BBCH14. Nelle zone in cui il germogliamento è in una fase più avanzata la vegetazione appare uniforme.

Varietà	Minimo	Massimo
Corvina	BBCH-10 (uscita foglie)	BBCH-14 (4 foglie spiegate)
Garganega	BBCH-09 (germogliamento)	BBCH-10 (uscita foglie)
Chardonnay	BBCH-010 (uscita foglie)	BBCH-14 (4 foglie spiegate)
Pinot Grigio	BBCH-010 (uscita foglie)	BBCH-14 (4 foglie spiegate)

Andamento meteo: Dopo l'episodio piovoso della scorsa settimana si prevede un fronte perturbato a partire da mercoledì 19 aprile pomeriggio. Le temperature sono leggermente sotto la media del periodo.

La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 18/04/2023, considerato l'andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori:

Difesa fitosanitaria:

Peronospora: Con le bagnature della scorsa settimana, le oospore della peronospora hanno raggiunto la maturazione. La maggior parte delle varietà ha raggiunto uno stadio di 3-4 foglie spiegate e quindi manifesta sensibilità alla malattia. Si consiglia quindi di intervenire, prima delle piogge, su tutte le varietà che hanno iniziato lo sviluppo delle foglie (anche se non hanno raggiunto i 10 cm) con prodotti di copertura, come per esempio, metiram, folpet e dithianon.

Per le aziende biologiche si consiglia di utilizzare prodotti a base di rame con bagnanti specifici.

Oidio: il rischio di infezione rimane alto. Si consiglia di utilizzare zolfo a dosi elevate (in considerazione dei bassi volumi di acqua impiegati in questo periodo) abbinandolo al trattamento per la peronospora.

Alle aziende che nel 2022 hanno riscontrato problemi di oidio sulle varietà fortemente sensibili (esempio chardonnay e bianca fernanda) si consiglia, se non già effettuato, l'impiego di prodotti eradicanti.

Gestione del suolo: si consiglia di NON sfalciare fino alla completa fioritura del cotico erboso in modo da ottenerne il massimo beneficio in termini di apporto di elementi nutritivi.

Prossimo comunicato mercoledì 26 aprile.