## ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA
## Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

**Stadio fenologico:** Lo stadio medio è BBCH62. La maggior parte delle varietà è in fioritura.

| Varietà | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| Corvina | BBCH-57 (bottoni fiorali separati) | BBCH-65 (piena fioritura) |
| Garganega | BBCH-55 (grappoli visibili) | BBCH-57 (bottoni fiorali separati) |
| Chardonnay | BBCH-57 (bottoni fiorali separati) | BBCH-65 (piena fioritura) |
| Pinot Grigio | BBCH-57 (bottoni fiorali separati) | BBCH-65 (piena fioritura) |

**Andamento meteo**: I giorni scorsi sono stati caratterizzati da fenomeni piovosi sparsi. Il meteo prevede una fase perturbata per sabato 3 giugno.

**La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 30/05/2023, considerato l'andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori:**

**Difesa fitosanitaria:**

**Peronospora:** I dati della maggior parte dei modelli previsionali indicano un pericolo ELEVATO di infezione. Le piogge dei giorni scorsi sono state altamente infettanti. Si notano macchie d'olio su foglie e anche su grappolo.
Si consiglia quindi di trattare intervenendo nelle finestre utili e mantenendo gli intervalli minimi previsti dalle etichette: ATTENZIONE AD ALTERNARE I PRODOTTI.
È raccomandato l'utilizzo di prodotti endoterapici abbinati a prodotti di copertura resistenti al dilavamento; si ricorda che per una buona efficacia devono intercorrere almeno due ore tra il trattamento e la pioggia.
Dove la vegetazione è ben sviluppata, anche per le aziende biologiche, è consigliabile aggiungere ai prodotti di copertura anche prodotti induttori di resistenza.
Su biologico può essere utilizzato l'olio essenziale di arancio.
Visto il periodo particolarmente delicato è utile l'impiego di bagnanti adesivanti per migliorare le performances dei prodotti.

**Oidio:** il rischio di infezione rimane ELEVATO. Si raccomanda di abbinare allo zolfo prodotti endoterapici.
Per chi intende utilizzare induttori di resistenza, si ricorda che questi hanno anche attività antioidica.
ATTENZIONE AGLI INTERVALLI MINIMI DI ETICHETTA E AD ALTERNARE I PRINCIPI ATTIVI!

**Scaphoideus titanus:** vedi allegato.

**Operazioni colturali:**
Scacchiatura e spollonatura: si consiglia di provvedere all'eliminazione dei doppi germogli e dei polloni. Proseguire la palizzatura dei germogli.
Attenzione ad evitare concimi fogliari nella fase di fioritura in quanto alcuni potrebbero causare fitotossicità.

Prossimo comunicato martedì 6 giugno.


Consorzio Custoza: info@vinocustoza.it
Consorzio Bardolino: segreteria@consorziobardolino.it