

ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA

Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

Stadio fenologico: Lo sviluppo della vegetazione procede molto velocemente ed in modo uniforme sulla maggior parte delle varietà. Lo stadio medio è BBCH53.

Varietà	Minimo	Massimo
Corvina	BBCH-14 (4 foglie spiegate)	BBCH-55 (grappoli separati)
Garganega	BBCH-11 (sviluppo foglie)	BBCH-14 (4 foglie spiegate)
Chardonnay	BBCH-14 (4 foglie spiegate)	BBCH-55 (grappoli separati)
Pinot Grigio	BBCH-14 (4 foglie spiegate)	BBCH-55 (grappoli separati)

Andamento meteo: Le previsioni meteo danno pioggia per tutta la settimana a partire da stasera. prevista una settimana piovosa a partire da stasera.

La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 09/05/2023, considerato l'andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori:

Difesa fitosanitaria:

Peronospora: I dati della maggior parte dei modelli previsionali indicano un pericolo MEDIO ELEVATO di infezione.

Si consiglia quindi di ripristinare la copertura della nuova vegetazione intervenendo nelle finestre utili e mantenendo gli intervalli minimi previsti dalle etichette, attenzione ad alternare i prodotti.

È possibile utilizzare anche prodotti citotropici e sistemici; si ricorda che per una buona efficacia devono intercorrere almeno due ore tra il trattamento e la pioggia.

Dove la vegetazione è ben sviluppata, anche per le aziende biologiche, è consigliabile aggiungere ai prodotti di copertura anche prodotti induttori di resistenza.

Su biologico può essere utilizzato l'olio essenziale di arancio.

Visto il periodo particolarmente delicato è utile l'impiego di bagnanti adesivanti per migliorare le performances dei prodotti.

Oidio: il rischio di infezione rimane ALTO. Si consiglia di utilizzare zolfo a dosi elevate abbinandolo al trattamento per la peronospora.

A chi intende utilizzare prodotti sistemici o citotropici per la peronospora si consiglia di abbinare un prodotto antiodico di pari efficacia. Attenzione agli intervalli minimi di etichetta ed alternare i principi attivi!

Per chi intende utilizzare induttori di resistenza, si ricorda che hanno anche attività antiodica.

Gestione del suolo: Nei vigneti dove il cotico erboso ha completato la fioritura si può iniziare a sfalcare a filari alterni.

Operazioni colturali:

Scacchiatura e spollonatura: si consiglia di provvedere all'eliminazione dei doppi germogli e dei polloni.

Prossimo comunicato martedì 16 maggio.