

ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA

Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

Stadio fenologico: Lo sviluppo della vegetazione procede molto velocemente ed in modo uniforme sulla maggior parte delle varietà. Lo stadio medio è BBCH55.

Varietà	Minimo	Massimo
Corvina	BBCH-53 (grappoli visibili)	BBCH-57 (grappoli visibili)
Garganega	BBCH-14 (4 foglie spiegate)	BBCH-53 (4 foglie spiegate)
Chardonnay	BBCH-53 (grappoli visibili)	BBCH-57 (bottoni fiorali separati)
Pinot Grigio	BBCH-53 (grappoli visibili)	BBCH-57 (bottoni fiorali separati)

Andamento meteo: Le previsioni meteo danno pioggia per tutta la settimana con una possibile pausa nel giorno di giovedì.

La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 16/05/2023, considerato l'andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori:

Difesa fitosanitaria:

Peronospora: I dati della maggior parte dei modelli previsionali indicano un pericolo ELEVATO di infezione. Si consiglia quindi di trattare intervenendo nelle finestre utili e mantenendo gli intervalli minimi previsti dalle etichette, attenzione ad alternare i prodotti.

È raccomandato l'utilizzo di prodotti endoterapici abbinati a prodotti di copertura resistenti al dilavamento; si ricorda che per una buona efficacia devono intercorrere almeno due ore tra il trattamento e la pioggia.

Dove la vegetazione è ben sviluppata, anche per le aziende biologiche, è consigliabile aggiungere ai prodotti di copertura anche prodotti induttori di resistenza.

Su biologico può essere utilizzato l'olio essenziale di arancio.

Visto il periodo particolarmente delicato è utile l'impiego di bagnanti adesivanti per migliorare le performances dei prodotti.

Oidio: il rischio di infezione rimane ELEVATO.

Si raccomanda di abbinare allo zolfo prodotti endoterapici.

Per chi intende utilizzare induttori di resistenza, si ricorda che hanno anche attività antioidica.

ATTENZIONE AGLI INTERVALLI MINIMI DI ETICHETTA E AD ALTERNARE I PRINCIPI ATTIVI!

Cocciniglie: dove se ne riscontra presenza contattare il proprio tecnico per il corretto posizionamento di prodotti a base di pyriproxifen prima della fioritura.

Operazioni colturali:

Scacchiatura e spollonatura: si consiglia di provvedere all'eliminazione dei doppi germogli e dei polloni.

Nelle varietà più sviluppate iniziare la palizzata dei germogli.

Prossimo comunicato martedì 23 maggio.