

ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

Stadio fenologico: Lo sviluppo della vegetazione procede molto velocemente ed in modo uniforme sulla maggior parte delle varietà. Lo stadio medio è BBCH57.

Varietà	Minimo	Massimo
Corvina	BBCH-53 (grappoli visibili)	BBCH-57 (grappoli visibili)
Garganega	BBCH-14 (4 foglie spiegate)	BBCH-53 (4 foglie spiegate)
Chardonnay	BBCH-53 (grappoli visibili)	BBCH-57 (bottoni fiorali separati)
Pinot Grigio	BBCH-53 (grappoli visibili)	BBCH-57 (bottoni fiorali separati)

Andamento meteo: Il meteo prevede una fase perturbata tra mercoledì sera e giovedì, poi il tempo dovrebbe stabilizzarsi per il fine settimana.

La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 23/05/2023, considerato l'andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori:

Difesa fitosanitaria:

Peronospora: I dati della maggior parte dei modelli previsionali indicano un pericolo ELEVATO di infezione. Si notano le prime macchie d'olio e le prime sporulazioni dove la difesa non è stata puntuale.

Si consiglia quindi di trattare intervenendo nelle finestre utili e mantenendo gli intervalli minimi previsti dalle etichette: **ATTENZIONE AD ALTERNARE I PRODOTTI.**

È raccomandato l'utilizzo di prodotti endoterapici abbinati a prodotti di copertura resistenti al dilavamento; si ricorda che per una buona efficacia devono intercorrere almeno due ore tra il trattamento e la pioggia.

Dove la vegetazione è ben sviluppata, anche per le aziende biologiche, è consigliabile aggiungere ai prodotti di copertura anche prodotti induttori di resistenza.

Su biologico può essere utilizzato l'olio essenziale di arancio.

Visto il periodo particolarmente delicato è utile l'impiego di bagnanti adesivanti per migliorare le performances dei prodotti.

Oidio: il rischio di infezione rimane ELEVATO. Si raccomanda di abbinare allo zolfo prodotti endoterapici.

Per chi intende utilizzare induttori di resistenza, si ricorda che questi hanno anche attività antioidica.

ATTENZIONE AGLI INTERVALLI MINIMI DI ETICHETTA E AD ALTERNARE I PRINCIPI ATTIVI!

Tignoletta: nelle varietà a grappolo compatto, prima della fioritura, nelle aree non gestite con il metodo della confusione sessuale, si può intervenire in questi giorni con prodotti ovolarvicidi. Consultarsi con il proprio tecnico.

Scaphoideus titanus: dai monitoraggi nel nostro territorio sono state rilevate le prime forme giovanili (L1) dell'insetto vettore della flavescenza dorata. A breve daremo informazioni sulla difesa

GIALLUMI: IN PRESENZA DI GIALLUMI ASCRIVIBILI A FLAVESCENZA DORATA E/O LEGNO NERO CONTATTARE IL PROPRIO TECNICO ED ESTIRPARE LE PIANTE SINTOMATICHE

Cocciniglie: dove se ne riscontra presenza contattare il proprio tecnico per il corretto posizionamento di prodotti a base di pyriproxifen prima della fioritura.

Operazioni colturali:

Scacchiatura e spollonatura: si consiglia di provvedere all'eliminazione dei doppi germogli e dei polloni. Proseguire la palizzata dei germogli.

Attenzione ad evitare concimi fogliari nella fase di fioritura in quanto alcuni potrebbero causare fitotossicità.

Prossimo comunicato martedì 30 maggio.

Questo comunicato è redatto seguendo il **Disciplinare di produzione integrata** della Regione Veneto.