

**ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA Difesa integrata zona Custoza e Bardolino**

### SPECIALE FLAVESCENTZA DORATA

**Scaphoideus titanus:** dai monitoraggi sono state rilevate forme giovanili (L1, L2 e L3) sulla pagina inferiore delle foglie dei polloni. L'insetto è riconoscibile grazie ai due puntini neri nella parte terminale dell'addome.

L'U.O. Fitosanitario della Regione Veneto ha definito la finestra di intervento per i vigneti gestiti con difesa convenzionale/integrata:

**Il primo trattamento obbligatorio in difesa convenzionale nel nostro areale dovrà essere eseguito DAL 16 AL 26 GIUGNO 2023**

All'interno della Finestra temporale indicata dalla Regione, la commissione consiglia di utilizzare prodotti sistemici (Acetamiprid o Flupyradifurone) il prima possibile per garantirne la maggiore efficacia sulle forme giovanili.

Le Sostanze impiegabili contro *Scaphoideus titanus*, conformi alle disposizioni dei Decreti Dirigenziali n.47 del 26/05/2023 e n.48 del 29/05/2023 e al Documento tecnico ufficiale del Servizio Fitosanitario Nazionale N° 29 – Linee guida per i viticoltori ai fini del contrasto della flavescenza dorata sul territorio nazionale (aggiornamento al 7/6/2023) sono le seguenti:

SOSTANZE AMMESSE		
Tipologia	Difesa convenzionale/integrata	Difesa biologica
Insetticidi	Acetamiprid	Azadiractina
	Acrinatrina (fino al 29/06/2023)	Beauveria bassiana ATCC 74040
	Deltametrina	Olio essenziale di arancio dolce
	Etofenprox	Piretrine
	Flupyradifurone	Sali potassici di acidi grassi
	Lambda-cialotrina	
	Tau-fluvalinate	
Corroboranti	--	Caolino

SOSTANZE RACCOMANDATE IN ZONA INFESTATA		
Trattamento	Difesa convenzionale/integrata	Difesa biologica
1°	una tra quelle insetticide AMMESSE	Azadiractina, Beauveria bassiana, Piretrine
		Caolino*
2°	Acrinatrina (fino al 29/06/23), Deltametrina, Etofenprox, Lambda-cialotrina, Tau-fluvalinate	Piretrine
3°	--	Piretrine

**Si ricorda di:**

- **Sfalcire l'erba** (se è in fioritura) almeno 2-3 giorni prima del trattamento
- **Bagnare tutta la vegetazione** da ambo i lati, compresi i polloni e i ricacci lungo il fusto, impiegando **almeno 600 l/ha di acqua**.
- **Trattare nelle ore fresche della giornata**
- Si ricorda il divieto di applicazione di prodotti insetticidi durante la fioritura.

**Ogni proprietario e/o conduttore di vigneti è inoltre obbligato, durante la stagione primaverile-estiva, a capitozzare le piante con sintomi riconducibili a Flavescenza Dorata e ad estirpare le ceppaie entro la successiva stagione invernale.**

Questo comunicato è redatto seguendo il **Disciplinare di produzione integrata** della Regione Veneto.