

ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA

Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

Stadio fenologico: Lo stadio medio è BBCH73 sviluppo acini.

Varietà	Minimo	Massimo
Corvina	BBCH-71 (allegagione)	BBCH-75 (sviluppo acini)
Garganega	BBCH-69 (fine fioritura)	BBCH-67 (piena fioritura)
Chardonnay	BBCH-71 (allegagione)	BBCH-75 (sviluppo acini)
Pinot Grigio	BBCH-71 (allegagione)	BBCH-75 (sviluppo acini)

Andamento meteo: I giorni scorsi sono stati caratterizzati da fenomeni piovosi sparsi di diversa entità a seconda delle zone. Il meteo prevede tempo variabile fino a fine settimana con episodi piovosi di tipo temporalesco di lieve entità.

La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 13/06/2023, considerato l'andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori:

Difesa fitosanitaria:

Peronospora: le piogge dei giorni scorsi hanno dato origine ad ulteriori infezioni di peronospora, che ora sono visibili sia su foglie sia su grappoli e anche sulle femminelle in accrescimento.

Si consiglia quindi di trattare intervenendo nelle finestre utili e mantenendo gli intervalli minimi previsti dalle etichette. **ATTENZIONE AD ALTERNARE I PRODOTTI.**

È raccomandato l'utilizzo di prodotti endoterapici abbinati a prodotti di copertura preferendo prodotti cerodinamici; si ricorda che per una buona efficacia devono intercorrere almeno due ore tra il trattamento e la pioggia.

Dove la vegetazione è ben sviluppata, anche per le aziende biologiche, è consigliabile aggiungere ai prodotti di copertura anche prodotti induttori di resistenza. Su biologico può essere utilizzato l'olio essenziale di arancio.

Visto il periodo particolarmente delicato è utile l'impiego di bagnanti adesivanti per migliorare le performances dei prodotti.

Oidio: il rischio di infezione rimane ELEVATO e proseguono le infezioni su foglia. Si raccomanda di abbinare allo zolfo prodotti endoterapici. Per chi intende utilizzare induttori di resistenza, si ricorda che questi hanno anche attività antioidica.

ATTENZIONE AGLI INTERVALLI MINIMI DI ETICHETTA E AD ALTERNARE I PRINCIPI ATTIVI!

Cocciniglie (principalmente Partenolecanium corni): continua la migrazione delle neanidi. Dove ne fosse riscontrata la presenza contattare il proprio tecnico per posizionare correttamente il trattamento.

Botrite: per le varietà in fase di allegagione/prechiusura grappolo posizionare un prodotto antibotritico specifico. Per le aziende biologiche si consiglia di intervenire già in fase di fine fioritura con i prodotti ammessi. **IMPORTANTE: defogliare la fascia grappolo prima del trattamento per raggiungere il bersaglio.**

Scaphoideus titanus: Siamo in attesa di specifica comunicazione dalla Regione Veneto per la finestra del primo trattamento obbligatorio per il convenzionale/SQNPI. Aggiornamenti verranno inviati tempestivamente con un bollettino speciale.

Per quanto riguarda i prodotti da utilizzare si rimanda alla Guida emanata dalla regione Veneto che abbiamo già inviato e che riallegiamo alla presente.

Per i soli vigneti coltivati con metodo biologico la finestra di esecuzione del 1° trattamento obbligatorio, è compresa tra il 9 e il 19 giugno p.v. con i prodotti autorizzati. Il 2° e il 3° trattamento, come disposto a decreto, seguiranno a distanza di 7-10 gg.

Di seguito i principi attivi ammessi per il bio per ottemperare gli obblighi del decreto:

Azadiractina – Beauveria bassiana ATCC 74040 – Olio essenziale di arancio dolce – Piretrine – Sali potassici di acidi grassi.

Operazioni colturali:

Proseguire la palizzata dei germogli. Dove la vegetazione è particolarmente sviluppata ed è finita la fase di fioritura si può iniziare la cimatura dei tralci. Sfogliatura: le operazioni di sfogliatura andrebbero eseguite subito dopo la fioritura e solo dalla part nord o est dei filari per ridurre i fenomeni di scottature da sole.

Prossimo comunicato martedì 20 giugno.

Questo comunicato è redatto seguendo il **Disciplinare di produzione integrata** della Regione Veneto.