

ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA - Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

Stadio fenologico: Lo stadio medio è BBCH75 sviluppo acini.

Varietà	Minimo	Massimo
Corvina	BBCH-73 (sviluppo acini)	BBCH-77 (chiusura grappolo)
Garganega	BBCH-73 (sviluppo acini)	BBCH-75 (sviluppo acini)
Chardonnay	BBCH-73 (sviluppo acini)	BBCH-77 (chiusura grappolo)
Pinot Grigio	BBCH-73 (sviluppo acini)	BBCH-77 (chiusura grappolo)

Andamento meteo: I giorni scorsi sono stati caratterizzati bel tempo e temperature elevate. Le previsioni indicano tempo perturbato per tutta la settimana con possibili fenomeni temporaleschi.

La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 27/06/2023, considerato l'andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori:

Difesa fitosanitaria:

Peronospora: si riscontrano infezioni di peronospora sia su foglie che su grappoli e anche sulle femminelle in accrescimento.

Si consiglia quindi di trattare intervenendo nelle finestre utili e mantenendo gli intervalli minimi previsti dalle etichette. **ATTENZIONE AD ALTERNARE I PRODOTTI.**

È raccomandato l'utilizzo di prodotti endoterapici abbinati a prodotti di copertura preferendo prodotti cerodinamici; si ricorda che per una buona efficacia devono intercorrere almeno due ore tra il trattamento e la pioggia.

Dove la vegetazione è ben sviluppata, anche per le aziende biologiche, è consigliabile aggiungere ai prodotti di copertura anche prodotti induttori di resistenza. Per controllare le infezioni sulle femminelle può essere utilizzato l'olio essenziale di arancio sia in convezionale che in bio facendo attenzione alla compatibilità con altri prodotti (confrontarsi con il proprio tecnico).

Visto il periodo particolarmente delicato è utile l'impiego di bagnanti adesivanti per migliorare le performances dei prodotti.

Oidio: il rischio di infezione rimane ELEVATO, si notano infezioni su foglia e anche su grappolo. Si raccomanda di abbinare allo zolfo prodotti endoterapici. Per chi intende utilizzare induttori di resistenza, si ricorda che questi hanno anche attività antioidica. Ove possibile sono utili le solforazioni con zolfo ventilato. **ATTENZIONE AGLI INTERVALLI MINIMI DI ETICHETTA E AD ALTERNARE I PRINCIPI ATTIVI!**

Botrite: per le varietà in fase di prechiusura grappolo posizionare un prodotto antibotritico specifico. **IMPORTANTE: defogliare la fascia grappolo prima del trattamento per raggiungere il bersaglio.**

Tignoletta: continua il volo si seconda generazione. **Fuori dall'area gestita con il metodo della confusione sessuale**, a chi intende utilizzare un prodotto **ovicida**, si consiglia di effettuarlo tra il 24 e il 28 giugno pv.

Con i prodotti **ovolarvicidi** intervenire tra il 27 e il 30 giugno.

Con i prodotti **larvicidi** intervenire invece dal 30 giugno al 7 luglio.

Per i biologici si consiglia di posizionare un intervento con *Bacillus Thuringiensis* entro il 30 giugno ed il secondo entro il 7 luglio.

Scaphoideus titanus: Aziende **CONVENZIONALI: Secondo trattamento obbligatorio DAL 27 GIUGNO AL 7 LUGLIO.**

Per le aziende **BIOLOGICHE** **Attenzione: SECONDO trattamento obbligatorio a 7-10 giorni dal primo intervento e TERZO trattamento obbligatorio a 7-10 giorni dal secondo intervento (come da decreto di lotta obbligatoria).**

Prodotti raccomandati dal servizio fitosanitario regionale:

	CONVENZIONALE	BIO
2°	Acrinatrina (fino al 29/06/23) o Deltametrina o Etofenprox o Lambda-cialotrina o Tau-fluvalinate	Piretrine
3°	--	Piretrine

Operazioni colturali: Sospendere le operazioni di sfogliatura. Irrigare ove necessario.

Carenza di Magnesio: laddove si riscontrano fenomeni di carenza di magnesio, in questo periodo si possono abbinare ai trattamenti concimi fogliari a base di calcio e magnesio utili anche per l'ispessimento della buccia.

Prossimo comunicato martedì 4 luglio.

Questo comunicato è redatto seguendo il **Disciplinare di produzione integrata** della Regione Veneto.