

ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA - Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

Stadio fenologico: Lo stadio medio è BBCH77 chiusura grappolo.

Varietà	Minimo	Massimo
Corvina	BBCH-75 (sviluppo acini)	BBCH-81 (invaiaitura)
Garganega	BBCH-75 (sviluppo acini)	BBCH-75 (sviluppo acini)
Chardonnay	BBCH-75 (sviluppo acini)	BBCH-77 (chiusura grappolo)
Pinot Grigio	BBCH-75 (sviluppo acini)	BBCH-81 (invaiaitura)

Andamento meteo: nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 luglio nel territorio sono avvenuti fenomeni grandinigeni di diverse entità. Si prevede un progressivo miglioramento delle condizioni metereologiche.

La commissione tecnico-viticola per la difesa fitosanitaria integrata riunitasi in data 25/07/2023, considerato l'andamento climatico e vegetativo, consiglia ai viticoltori:

Difesa fitosanitaria:

Zone grandinate: vitigni precoci grandinati: trattamenti a base di rame aggiungendo zolfo e corroboranti come per esempio zeoliti.

Vitigni tardivi grandinati: oltre all'utilizzo di rame, zolfo e zeoliti, è possibile l'impiego di folpet in alternativa al rame purché in etichetta riporti come avversità Carie Bianca (marciume bianco) e rispettando i tempi di carenza e le prescrizioni di etichetta.

Peronospora: si riscontrano infezioni di peronospora larvata su grappolo soprattutto sulle varietà a bacca rossa, oltre che su foglie e femminelle in accrescimento.

Si consiglia quindi di trattare intervenendo nelle finestre utili e mantenendo gli intervalli minimi previsti dalle etichette.

ATTENZIONE AD ALTERNARE I PRODOTTI E AI TEMPI DI CARENZA!!

È raccomandato l'utilizzo di prodotti endoterapici abbinati a prodotti di copertura preferendo prodotti cerodinamici; si ricorda che per una buona efficacia devono intercorrere almeno due ore tra il trattamento e la pioggia.

Dove la vegetazione è ben sviluppata, anche per le aziende biologiche, è consigliabile aggiungere ai prodotti di copertura anche prodotti induttori di resistenza. Per controllare le infezioni sulle femminelle può essere utilizzato l'olio essenziale di arancio sia in convenzionale che in bio facendo attenzione alla compatibilità con altri prodotti (confrontarsi con il proprio tecnico).

Visto il periodo particolarmente delicato è utile l'impiego di bagnanti adesivanti per migliorare le performances dei prodotti.

Oidio: il rischio di infezione rimane ELEVATO, si notano infezioni su foglia e anche su grappolo. Si raccomanda di abbinare allo zolfo prodotti endoterapici. Per chi intende utilizzare induttori di resistenza, si ricorda che questi hanno anche attività antioidica.

Ove possibile sono utili le solforazioni con zolfo ventilato. **ATTENZIONE AGLI INTERVALLI MINIMI DI ETICHETTA E AD ALTERNARE I PRINCIPI ATTIVI!**

Botrite: per le varietà ad inizio invaiatura effettuare un trattamento antibotritico specifico preferendo prodotti a bassa residualità preferendo prodotti biologici. **ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA!**

Favescenza dorata: ESTIRPARE LE PIANTE SINTOMATICHE AL PIU' PRESTO!

Operazioni colturali: Sospendere le operazioni di sfogliatura.

Irrigare ove necessario.

Carenza di Magnesio: laddove si riscontrano fenomeni di carenza di magnesio, in questo periodo si possono abbinare ai trattamenti concimi fogliari a base di calcio e magnesio utili anche per l'ispessimento della buccia.

Per evitare le scottature si possono impiegare prodotti adatti allo scopo (antitranspiranti, caolino, ecc.)

Prossimo comunicato martedì 1 agosto.

Questo comunicato è redatto seguendo il **Disciplinare di produzione integrata** della Regione Veneto.