CUSTOZA

COMUNICATO TECNICO

Consorzio Vini Bardolino

COMUNICATO TECNICO N. 16 DEL 17/06/2024

ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA
Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

Stadio fenologico: Fase fenologica compresa tra BBCH da 071 a 077.

Varietà	Minimo	Massimo
Corvina	BBCH-71 (allegagione)	BBCH-75 (sviluppo degli acini)
Garganega	BBCH-71 (allegagione)	BBCH-71 (allegagione)
Chardonnay	BBCH-71 (allegagione)	BBCH-77 (chiusura del grappolo)
Pinot Grigio	BBCH-71 (allegagione)	BBCH-77 (chiusura del grappolo)

Previsioni meteo:
La scorsa settimana è stata caratterizzata tempo variabile e temperature nella norma. Si prevede tempo stabile fino a fine settimana.

Difesa fitosanitaria:

Peronospora: Si riscontrano infezioni in atto, in alcuni casi anche su grappolo. Proseguire con una difesa accorta utilizzando prodotti citotropici, endoterapici, sistemici e cerodinamici specifici per garantire la migliore protezione del grappolo avendo cura di alternare i prodotti. Risulta sempre utile l'aggiunta di fosfiti e fosfonati.

BIO: Nei vigneti a conduzione biologica si consiglia di abbinare prodotti in grado di ridurre il dilavamento e induttori di resistenza. In caso di infezioni in corso utilizzare prodotti a base di olio essenziale di arancio dolce.

Oidio: il rischio di infezioni rimane molto alto. Si consiglia di abbinare adeguati prodotti antioidici sistemici o endoterapici.

Botrite: entro questa settimana si può intervenire con prodotti antibotritici possibilmente andando a bersaglio sulla fascia grappolo.

Tignoletta: sta iniziando il volo di seconda generazione. Per il trattamento con ovicida intervenire entro il 22 giugno ad esclusione delle zone gestite con il metodo della confusione sessuale.

Scaphoideus Titanus – lotta obbligatoria:
Per le aziende convenzionali, come già comunicato con apposito notiziario n. 15, la prima finestra del trattamento obbligatorio è dal 14 al 22 giugno.
Per le aziende biologiche o quelle che non intendono eseguire una difesa chimica, si ricorda che il secondo e il terzo intervento vanno distanziati 7-12 giorni uno dall'altro.
Alcuni prodotti indicati per la difesa contro lo Scaphoideus sono utili anche nella difesa alle cocciniglie.

NB PER TUTTI: SI CONSIGLIA DI ABBINARE DEI PRODOTTI BAGNANTI-SINERGIZZANTI AI TRATTAMENTI PER MIGLIORARNE LA PERSISTENZA.

Cimature e sfogliatura: proseguire queste operazioni sulle forme di allevamento che lo richiedono.

Gestione agronomica del verde: cimature e defogliazioni risultano quest'anno indispensabili per garantire il successo nella difesa delle principali malattie fungine.

Disseccamento del rachide: questo è il momento per intervenire con calcio e magnesio per prevenire il disseccamento del rachide

Prossimo comunicato lunedì 24 giugno.

Questo comunicato è redatto seguendo il **Disciplinare di Produzione Integrata** della Regione Veneto

Consorzio Custoza: info@vinocustoza.it Consorzio Bardolino: segreteria@consorziobardolino.it