

COMUNICATO TECNICO N. 19 DEL 01/07/2024

ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA
Difesa integrata zona Custoza e Bardolino

Stadio fenologico: Fase fenologica compresa tra BBCH da 071 a 077.

Varietà	Minimo	Massimo
Corvina	BBCH-75 (sviluppo degli acini)	BBCH-77 (chiusura del grappolo)
Garganega	BBCH-71 (allegagione)	BBCH-75 (sviluppo degli acini)
Chardonnay	BBCH-75 (sviluppo degli acini)	BBCH-77 (chiusura del grappolo)
Pinot Grigio	BBCH-75 (sviluppo degli acini)	BBCH-77 (chiusura del grappolo)

Previsioni meteo:

La scorsa settimana è stata caratterizzata tempo variabile con un miglioramento nel fine settimana. Si prevede tempo perturbato fino a mercoledì.

Difesa fitosanitaria:

Peronospora: Si riscontrano infezioni in atto, in alcuni casi anche su grappolo. Appena possibile proseguire con una difesa accorta utilizzando prodotti citotropici, endoterapici, sistemici e cerodinamici specifici per garantire la migliore protezione del grappolo avendo cura di alternare i prodotti. Risulta sempre utile l'aggiunta di fosfiti e fosfonati o induttori di resistenza

BIO: Nei vigneti a conduzione biologica si consiglia di abbinare prodotti in grado di ridurre il dilavamento e induttori di resistenza. In caso di infezioni in corso utilizzare prodotti a base di olio essenziale di arancio dolce.

Oidio: il rischio di infezioni rimane molto alto. Si consiglia di abbinare adeguati prodotti antioidici sistemici o endoterapici. Buoni anche gli interventi con zolfo polverulento.

Botrite: entro questa settimana si può intervenire per le varietà tardive con prodotti antibotritici possibilmente andando a bersaglio sulla fascia grappolo.

Tignoletta: prosegue il volo di seconda generazione. Per il trattamento con larvicidi intervenire entro il 6 luglio ad esclusione delle zone gestite con il metodo della confusione sessuale.

Scaphoideus Titanus – lotta obbligatoria:

Per le aziende convenzionali, come già comunicato con apposito notiziario n. 17, la seconda finestra del trattamento obbligatorio è dal 24 giugno al 6 luglio a distanza di almeno 10 giorni dal primo trattamento.

Per le aziende biologiche o quelle che non intendono eseguire una difesa chimica, si ricorda che il secondo e il terzo intervento vanno distanziati 7-12 giorni uno dall'altro.

Alcuni prodotti indicati per la difesa contro lo Scaphoideus sono utili anche nella difesa alle cocciniglie.

NB PER TUTTI: SI CONSIGLIA DI ABBINARE DEI PRODOTTI BAGNANTI-SINERGIZZANTI AI TRATTAMENTI PER MIGLIORARNE LA PERSISTENZA.

Scottature da sole: si sono viste le prime scottature da sole sui grappoli. Per proteggere la produzione sono utili gli interventi con caolino e zeolite ed evitare di sfogliare a sud e ovest i filari.

Cimature e sfogliatura: proseguire queste operazioni sulle forme di allevamento che lo richiedono. Cimature e defogliazioni risultano quest'anno indispensabili per garantire il successo nella difesa delle principali malattie fungine.

Disseccamento del rachide: questo è il momento per intervenire con calcio e magnesio per prevenire il disseccamento del rachide

Si ricorda l'evento in vigneto per il riconoscimento del vettore della flavescenza dorata giovedì 4 luglio ore 10.30 in via Sabbioni a Palazzolo di Sona

Prossimo comunicato lunedì 8 luglio.

Questo comunicato è redatto seguendo il **Disciplinare di Produzione Integrata** della Regione Veneto
Consorzio Custoza: info@vinocustoza.it Consorzio Bardolino: segreteria@consorziobardolino.it